

必須放冰箱貯存之藥品安定性

2010/10 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
1	Actilyse inj. 50mg	血栓溶解劑	2-8°C	同標示效期 (<30°C)
2	Adacel vaccine inj	巴斯德三合一補追疫苗	2-8°C	NA
3	Adalimumab inj (<i>Humira</i> ®)	中度至重度類風濕性關節炎，乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎。	2-8°C	NA
4	Agalsidase alfa inj 3.5mg/3.5ml (<i>Replagal</i> ®)	法布瑞氏症 (Fabry disease)	2-8°C	NA
5	Aldesleukin-18 MU inj (<i>Proleukin</i> ®)	免疫調節劑	2-8°C	NA
6	Alkeran tab 2 mg	抗癌藥	2-8°C 避光	NA
7	Ambisome inj. 50 mg/vial	抗黴菌	<25°C	配製後：24 小時 (2-8°C)
8	Amphotericin-B inj. 50 mg/vial (<i>Fungizone</i> ®)	抗黴菌 (Fungizone)	2-8°C	2-4 週
9	Anti-venin (hemo) inj.	抗毒蛇血清 (出血性)	2-8°C	NA
10	Anti-venin (neuro) inj.	抗毒蛇血清 (神經性)	2-8°C	NA
11	Aptivus (Tipranavir) cap. 250 mg	愛滋病毒感染	2-8°C	開封後，<25 °C 可貯存 60 天
12	Atosiban inj. 7.5 mg/ml, (<i>Tractocile</i> ®) 0.9 ml/vial & 5 ml/vial	延遲妊娠婦女迫切的早產	2-8°C	一旦開瓶必須立刻使用
13	Atracurium inj. 25 mg/amp (<i>Tracrium</i> ®, <i>Genso</i> ®)	神經肌肉阻斷劑	2-8°C	一旦離開過冰箱必須在 14 天內用完
14	B.C.G. vaccine inj. 81mg/vial	治療或預防膀胱癌	2-8°C	NA
15	Basiliximab inj. 20 mg/vial (<i>Simulect</i> ®)	單株抗體，器官移植用藥	2-8°C	運送與儲存皆必須於 2-8°C 狀態下
16	Bevacizumab inj. 100 mg/4 ml (<i>Avastin</i> ®)	一種單株抗體，用於治療大腸癌	2-8°C	NA
17	Biseko 50 ml/vial	血清蛋白用於低蛋白血症、休克、燒傷	2-8°C	NA
18	Bortezomib inj 3.5 ng/vial (<i>Velcade</i> ®)	多發性骨髓癌	2-8°C	8 小時 (稀釋後)
19	Bulsulfan inj (<i>Busulfex</i> ®)	化療藥物	2-8°C	配製後 8 小時內使用完畢

必須放冰箱貯存之藥品安定性

2010/10 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
20	Calciumfolinat inj 100 mg	大劑量 Methotrexate 之解毒劑	2-8°C 避光	NA
21	Calcitonin inj.	抑鈣素	2-8°C	NA
22	Calcitonin-200 nasal	抑鈣素 (鼻噴劑)	2-8°C	開封後 28 天
23	Carmustine inj.100mg/vial	抗癌劑	2-8°C	NA
24	Caspofungin inj. 50mg/vial	抗黴菌	2-8°C	NA
25	Cetuximab inj 100 mg/50ml/vial (Erbix [®])	直腸結腸癌	2-8°C	8 小時
26	Choriogonadotropin alfa (Ovidrel [®])	誘導排卵	2-25°C	配製後: 30 天(2-8°C)
27	Cisatracurium besylate inj (Nimbex [®]) 10mg/amp	神經肌肉阻斷劑	2-8°C	21 天 (<25°C)
28	Cytomegalo-immunoglobulin 2500u (Cytotect [®])	人類巨細胞病毒免疫球蛋白.	2-8°C	開封後 6 小時內使用, 並於 12 小時內使用完畢
29	D.T.I.C. inj. 200mg	抗癌劑	2-8°C	NA
30	Daptomycin inj 500 ng/vial (Cubicin [®])	抗生素	2-8°C	室溫 12 小時 (稀釋後)
31	Darbepoetin 20 mcg/syringe	紅血球生成素(DPO, 長效)	2-8°C	7 天 (<25°C)
32	Desmopressin inj. 4 mcg/ml	尿崩症或刺激 von Willebrand factor 釋出	2-8°C	NA
33	Dinoprostone vaginal tab.	妊娠末期之陣痛誘發及促進	2-8°C	NA
34	Engerix-B vaccine 20mcg/ml	B 肝疫苗	2-8°C	NA
35	Epoetin 5000 U/syringe (Recormon [®])	紅血球生成素 EPO	2-8°C	3 天 (<25°C)
36	Ergonovine 0.2 mg/ml/amp	治療或預防產後子宮出血	2-8°C	60 天
37	Erythropoietin inj. 2000U/syringe (Eprex [®])	紅血球生成素 EPO	2-8°C	7 天
38	Etanercept inj 25 mg/vial (Enbrel [®])	類風濕性關節炎	2-8°C	45 天 (<25°C)

必須放冰箱貯存之藥品安定性

2010/10 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
39	Fluanxol-Depot inj. 20 mg	治療精神疾病	<15°C	同標示效期
40	Follitropin alfa inj 75 IU/ampl (Gonal-F®)	治療不孕症	<25°C	同標示效期
41	Follitropin beta inj 300 IU/vial (Puregon®)	治療不孕症	2-8°C	3 個月 (<25°C)
42	Fortovase® -200 cap.	治療 AIDS	2-8°C	3 個月
43	Gardasil inj	人類乳突病毒疫苗	2-8°C	NA
44	Genotropin 16 IU inj.	生長激素	2-8°C	1 個月 (<25°C)
45	Glatiramer inj (Copaxone®)	復發型多發性硬化症	2-8°C	7 天
46	Glucagon inj. 1mg	治療低血糖症	2-8°C	NA
47	HCG 5000U/vial (Forstrong®)	排卵激素	<25°C 避光	同標示效期
48	Hemofil-M inj. 250U & 500U	治療血友病 A 型 (先天第八凝血因子缺乏症)	2-8°C	同標示效期 (<25°C)
49	Hepatect inj 500 IU/vial	B 肝免疫球蛋白 (for IV)	2-8°C	NA
50	Humalog Mix 25 inj 100 IU/ml, 3 ml/cartridge	胰島素	2-8°C	28 天 (<30°C)
51	Human papillomavirus vaccine (Cervarix®)	人類乳突病毒第 16/18 型疫苗	2-8°C	NA
52	Humatrope inj. 5mg	生長激素	2-8°C	NA
53	Humulin N7/R3 10ml	胰島素	2-8°C	28 天 (<30°C)
54	Hyper-Hep inj. 0.5ml & 5ml	B 肝免疫球蛋白 (for IM)	2-8°C	NA
55	Hyprho-D inj.	Rho(D) Immune Globulin	2-8°C	NA
56	Imiglucerase 200 IU inj.	治療高雪氏症 (罕見疾病)	2-8°C	NA
57	Immunoglobulin inj 3.0 gm/vial	免疫球蛋白	2-8°C	NA

必須放冰箱貯存之藥品安定性

2010/10 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
58	Infanrix-hexa (DPTa-IPV-HB-Hib)	嬰護寧六合一疫苗	2-8°C	NA
59	Infuvita inj.	綜合維他命 (TPN)	2-8°C	NA
60	Insulatard HM 10ml	胰島素	2-8°C	開封後 6 週
61	Insulatard penfil- CART	胰島素	2-8°C	開封後 4 週
62	Insulin Detemir (Levemir FlexPen)	胰島素	2-8°C	開封後 6 週
63	Intron A inj 3 MU & 5 MU.	干擾素	2-8°C	NA
64	Kaletra cap.	治療 AIDS	2-8°C	2 個月 (<25°C)
65	Kogenate inj 250IU & 500IU (Factor VIII)	治療血友病 A 型	2-8°C 避光	配製後：3 小時 (不可放回冷藏)
66	Lanreotide acetate inj (Somatuline® Autogel)	肢端肥大症	2-8°C	NA
67	Lanreotide-30 inj.	人工合成的體抑素	2-8°C	NA
68	Lantus soloStar 300U/注射筆	胰島素	2-8°C	4 週 (<25°C)
69	Leunase 5000U inj.	急性白血病	2-8°C	48 小時
70	Lorazepam inj. 2mg/ml	鎮靜劑	2-8°C	NA
71	Lyo-Povigen inj.	綜合維他命	2-8°C	NA
72	M.M.R. vaccine	疫苗	2-8°C	NA
73	Minirin 10 mcg/puff (鼻噴劑)	治療尿崩症	<25°C	同標示效期
74	Mircera 50 mcg, 100mcg/syringe	紅血球生成素 (EPO)	2-8°C	30 天內 (< 25°C)
75	Mitomycin oph drop	眼藥水 (抗癌劑)	2-8°C	NA
76	NaCl eye drop 3%	眼藥水	2-8°C	14 天

必須放冰箱貯存之藥品安定性

2010/10 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
77	Natamycin oph drop	眼藥水	2-8°C	同標示效期 (<25°C)
78	Novomix penfil inj. 3ml	胰島素	2-8°C	開封後 4 週
79	Novorapid penfil inj. 3ml	胰島素	2-8°C	開封後 4 週
80	NovoSeven-inj 60KIU/1.2mg/vial (Factor VII)	A 型及 B 型血友病發生抗第八及第九因子抗體者、缺乏第七因子者	2-8°C 避光	配製後：3 小時 (<25°C)
81	Omalizumab (Xolair [®])	單株抗體，治療過敏性氣喘	2-8°C	配製後： 8 小時 (2-8°C) 4 小時 (室溫)
82	Oprelvekin 5mg inj.	Interleukin-11 (治療化療相關之嚴重血小板低下症)	2-8°C	NA
83	Oxytocin inj.	催產劑	2-8°C	30 天 (15-25°C)
84	Pavulon 4mg inj.	神經肌肉阻斷劑	2-8°C	6 個月 (<25°C)
85	Pediacel vaccine	巴斯德五合一疫苗	2-8°C	NA
86	Pegasys 180 mcg/syringe (Interferon α-2a)	干擾素 (治療 B 肝及 C 肝)	2-8°C	NA
87	Peg-Intron 100mcg/vial (Interferon α-2b)	干擾素 (治療 C 肝)	2-8°C	NA
88	Pneumococcal vaccine 0.5ml	肺炎球菌疫苗	2-8°C	NA
89	PPD inj	結合菌素抗原 (診斷 TB 用)	2-8°C	NA
90	Prevenar vaccine 0.5ml	七價肺炎球菌疫苗: 2 個月至 2 歲幼兒適用	2-8°C	NA
91	Rescular eye drop 5ml/bot	治療廣角開放性青光眼	2-8°C	NA
92	rhG-CSF inj 300 mcg & 75 mcg	嗜中性白血球增生劑	2-8°C	24 小時
93	Risperdal Consta inj 25 mg/vial	治療精神分裂症	2-8°C	7 天 (<25°C)
94	Rinderon -A oph solution 0.1% 5 ml	類固醇眼藥水	2-8°C	NA
95	Rituximab	單株抗體，治療	2-8°C	NA

必須放冰箱貯存之藥品安定性

2010/10 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
96	Roferon A inj 3MU	干擾素	2-8°C	NA
97	Rotavirus vaccine (<i>Rotarix</i> [®] , <i>Rotatec</i> [®])	口服活性輪狀病毒疫苗	2-8°C	運送與儲存皆必須於 2-8°C 狀態下
98	Sandostatin inj. 0.1mg	預防胰臟術後併發症，治療胃食道靜脈曲張出血	2-8°C	2 週
99	Saizen inj 8mg	小孩生長激素缺乏	2-8°C	NA
100	Survanta susp. 200 mg/ml	治療新生兒呼吸窘迫症 (RDS)	2-8°C	NA
101	Synacthen 0.25 mg/amp	ACTH stimulation test	2-8°C	NA
102	Taxotere inj. 20 mg & 80 mg	抗癌劑	2-8°C	NA
103	Teriparatide inj	治療骨質疏鬆	2-8°C	應隨時儲存於 2-8°C
104	Tetanus antitoxin 1500 IU	破傷風抗毒素	2-10°C	NA
105	Tetanus Toxoid 20ml/vial	破傷風類毒素	2-10°C	NA
106	Thymoglobulin inj. 25 mg	抗胸腺細胞免疫球蛋白	2-8°C	NA
107	Timentin inj 1.6 gm/vial	抗生素	2-8°C	NA
108	Trastuzumab inj. 440 mg (<i>Herceptin</i> [®])	單株抗體，治療轉移性乳癌	2-8°C	NA
109	Varilrix vaccine 0.5 ml inj	水痘疫苗	2-8°C	NA
110	Vaxigrip vaccine 0.25 ml & 0.5 ml inj	感冒疫苗	2-8°C	NA
111	Velbe inj. 10 mg.	抗癌劑	2-8°C	NA
112	Vincristine inj. 1 mg	抗癌劑	2-8°C	NA
113	Vinorelbine inj 10 mg & 50 mg	非小細胞肺癌 轉移性乳癌	2-8°C	72 小時 (<25°C)
114	Vinorelbine 20 mg/cap (<i>Navelbine</i> [®])	非小細胞肺癌 轉移性乳癌	2-8°C	NA

必須放冰箱貯存之藥品安定性

2010/10 更新

項次	藥名	治療用途	儲藏溫度	可置於室溫時間
115	Xalatan oph 2.5 ml/bot	治療青光眼眼藥水	2-8°C	4 週 (<25°C)

參考來源:

1. Micromedex Healthcare Series
2. American Hospital Formulary Service, Drug Information 2007, ASHP, Washington, DC
3. 藥物仿單

附註: 1. NA: no data available.

2. 可置於室溫時間屬 NA 者, 若為首日劑量時, 請護理站派專人領取; 屬單一劑量藥車給藥時則隨藥車配送並請護理站點收後立即放入冰箱保存。