



衛教編號 GYN-004

1995.06.06 訂定  
2015.09.25 (10 修)  
2018.09.05 (13 審)

## 子宮頸圓錐狀切除術照護須知

### 一、前言：

子宮頸圓錐狀切除術是子宮頸上皮產生病變時，做為診斷及治療的一種方法，也是婦科常見手術之一。

### 二、手術方式：

經由陰道以圓錐狀方式切除子宮頸病灶部分。圓錐切片之後，還會再做子宮頸管搔刮術，體外完全不留疤痕。一般手術時間大約 20~30 分鐘。

全人智慧 醫療典範  
愛心 品質 創新 當責

經婦科專科醫師檢視  
臺中榮民總醫院護理部編印

### 三、手術前護理：

- (一)手術前，請卸除您的口紅及指甲油，尤其是特殊的光療指甲，以方便手術中觀察您血氧飽和度。
- (二)完成心電圖、胸部 X 光、抽血及小便常規檢查。
- (三)經主治及麻醉醫師向您或家屬解釋手術過程及相關風險後，請填妥手術同意書及麻醉同意書。
- (四)手術前 6-8 小時，請開始禁食、禁水。
- (五)手術當天，護理師會請您更換手術衣，並移除身上的飾品，包括：手錶、戒指、耳環、隱形眼鏡、活動式假牙、手環、護身符、內衣、內褲等，入手術室前，護理師將為您執行靜脈點滴注射，以便手術進行中給藥。

### 四、手術後護理：

- (一)手術後，如有嘔吐現象請採側睡，如無噁心、嘔吐現象，請於\_\_\_\_\_開始進食，術後飲食沒有禁忌。

## (二) 手術後陰道植入物

無放置紗布或引流管

放置引流管，回診時醫師會為您取出，請勿自行取出，萬一脫落也請不要擔心，不需自行將管路塞回，避免造成感染。

塞入紗布\_\_\_\_\_塊，於\_\_\_\_\_取出紗布，請您確認簽名\_\_\_\_\_。

可吸收式止血棉，請勿自行取出，萬一脫落也請不要擔心，亦不需自行塞回。

## 五、復健與預防合併症：

(一)保持會陰部乾燥及清潔，解尿或排便後由前往後擦拭(由尿道往肛門方向擦拭)，減少感染機會。

(二)手術後陰道內有少許出血，約二週內會自行停止，如果發生出血量約半小時即浸濕一塊衛生棉，或大量鮮血、血塊，須立即返回急診處理。

(三)手術後四~六週，避免騎、坐摩托車，避免提重物(2kg 以上)或作增加腹部壓力的動作。

(四)若出現以下狀況，應返診追蹤：發燒、傷口化膿、  
下腹劇痛、陰道大量出血或惡臭性分泌物。

(五)手術後六週，若醫師診察正常即可恢復房事。

(六)相關疑問請來電諮詢

婦科辦公室：(04) 23592525 轉 5801

婦科門診：(04) 23592525 轉 6557 或 6558

婦科病房：(04) 23592525 轉 8086 或 8087

恢復室：(04) 23592525 轉 8033