



2001.06.12 訂定 2022.07.14(9 審) 2023.06.26(11 修)

# 血糖及尿酮之自我測試



全人智慧 醫療典範 愛心 品質 創新 當責

*經新陳代謝科護理專家檢視* 臺中榮民總醫院護理部編印

# 一、血糖自我測試

## > 為何要自己測血糖?

監測血糖可以知道自己的血糖是否控制在正常範圍內。當飲食量不夠、運動量過多或藥物過量時,可能出現全身無力、心跳加速、冒冷汗等低血糖症狀,這時應立即服用 15 公克的含糖食物來提高血糖,另一種情形是當您覺得最近比以前更容易口渴、多尿及疲勞時,可以檢查血糖是否過高了。高低血糖的情形發生,表示需要重新分配飲食量及運動量,並詢問醫師是否該調整血糖用藥或胰島素劑量。若每次的血糖值都在正常範圍,則表示您的血糖控制得很好。




圖片來源:https://www.careonline.com.tw/

# > 如何測血糖?

步驟	過程									
	準備測量工具:									
	• 血糖機									
	• 血糖試紙(確認期限及是否受潮)									
1	• 採血筆									
	• 採血針	<b>III</b> III =								
	• 酒精棉片									
	• 針頭回收器	血糖機與試紙 採血筆/針 酒精棉片								
	將採血針裝入採血筆,依皮									
	膚薄厚調整採血筆上的刻度									
2	(數字越大表示採血越									
	深),之後用酒精棉片消毒採									
	血部位。									
2	將採血筆緊貼採血部位,壓	- Circular								
3	下採血筆按鈕後進行採血。									
	血糖機與採血部位呈 45 度角	有								
4	採血後,讀取血糖數值,再拿									
	酒精棉片進行加壓止血。									

採血針回收於硬殼且有蓋子 5 密封的瓶罐中,回診時帶到 醫院針頭回收處丟棄。



圖片來源: https://is.gd/UuTfHD

### > 血糖檢查的時間及次數?

- ✓ 若血糖控制穩定,至少每週檢查早餐前及晚上睡前血糖各一次。
- ✓ 若血糖控制不穩定,則每天至少測四次,即三餐 飯前和晚上睡前。
- ✓ 若自覺有冒冷汗、飢餓、頭暈等不舒服症狀時,需馬上測血糖,以了解有無高、低血糖情形。
- ✓ 若要抽血驗早餐飯前的血糖,則前晚半夜 12 時 後到早上檢查前,都不能吃任何食物、飲料,若 口渴難受,少量開水是可以允許的。

## ▶ 血糖值建議範圍是多少?

	正常人	糖尿病病人
飯前空腹	70-100 mg/dL	80-130 mg/dL
飯後2小時	小於 140 mg/dL	小於 180 mg/dL
晚上睡前	小於 120 mg/dL	110-150 mg/dL

可將家中血糖測試結果詳細紀錄,以作為醫師治療之參考(應視糖尿病人狀況調整治療目標)。

# 二、尿酮自我測試

#### ▶ 為何要自我測試尿酮?

當身體缺乏胰島素時,糖分無法進入細胞提供熱能,只好分解脂肪作為燃料,在分解脂肪的過程中,會釋放酸性物質叫做"酮體",酮體由尿中排出即為尿酮,所以出現尿酮即表示糖尿病控制不好。

## ▶ 什麼時候要測尿酮?

- ✓ 有噁心、嘔吐等症狀時
- ✓ 遇有外傷、感染症或大手術時
- ✓ 早上空腹血糖值超過 250 mg/dL 或任意時間血糖 大於 300 mg/dL。

#### > 如何測尿酮?

步驟	過程	
	檢查前半小時先解小便,然後	1/2
1	喝約 250 毫升的水,過半小時	
	後用尿杯留取半杯中段尿。	Sec. 1

2	將試紙檢驗區浸入尿液一秒鐘。	
3	取出試紙時,沿著容器 邊緣,去除多餘的尿液。	
4	等待一分鐘,讀取試紙 的顏色。	

圖片來源:https://is.gd/ALRjO1

### 三、結語

自我監測血糖、尿酮是控制血糖的一項重要工 具,藉由監測數據可以及早發現進而預防高、低血糖 併發症。

# 四、參考資料

蔡淑梅、曾錦瑋(2021)·內分泌系統病人的護理·林貴滿等,內外科護理技術(九版,201-205頁)·華杏。劉棻、鄭惠珍(2021)·內分泌和代謝功能障礙之護理・於陳麗敏總校閱·內外科護理技術(六版,75-80頁)·新文京開發。

讓我們來進行測驗,以確認您已充分了解

1.	低	血糖	症狀可	能有	飢餓	、全	身	無	力	` /	じじ	逃り	加達	東月	及冒	了冷	<b>&gt;</b> >	F
	等	0																
	$\bigcirc$	是	○否	○不:	知道													
2.	高	血糖	症狀可	能有	視力	模糊	月、	容	易	口	渴	`	多,	尿	及测	支学	岑	0
	$\bigcirc$	是	○否	○不:	知道													
3.	若	按時	服用降	血糖	藥或	施打	「胰	島	素	,	表	示.	血	糖	可以	人禾	急分	É
	受	到控	制,不	需要	每日	監測	山血	糖	值	0								
	$\bigcirc$	是	○否	○不:	知道													
4.	糖	尿病	病人飯	.後雨	小時	血粮	唐值	建	議	小	於	18	80	mg	g/d]	L	o	
	$\bigcirc$	是	○否	○不	知道													
5.	出	現尿	酮即表	示糖/	尿病	控制	小不	好	0									
	$\bigcirc$	是	○否	○不	知道													