



衛教編號：PED-004

2000.06.08 訂定  
2022.01.13(13 審)  
2023.06.07(11 修)

## 肝臟組織切片檢查

### 一、做檢查之目的

以穿刺針抽吸肝臟組織，作病理組織學檢查，以進一步確立診斷及治療。

### 二、檢查前注意事項

- (一) 檢查前 4-8 小時禁食、禁水。
- (二) 護理師會執行抽血檢查血色素、血小板、肝功能及凝血時間。
- (三) 經醫師解釋後填寫檢查同意書，若有需使用鎮靜藥物輔助檢查時，應增加填寫「深度鎮靜安眠藥物告知及使用同意書」。

全人智慧 醫療典範  
愛心 品質 創新 當責

經小兒肝膽科醫師專家檢視  
臺中榮民總醫院護理部編印

### 三、檢查前注意事項：

- (一)護理師會依照醫師指示予檢查前藥物，例如：止痛針、鎮靜劑，局部麻醉劑使病童配合，同時會注意唇色及呼吸，並備妥氧氣、面罩等急救用物。
- (二)由醫師消毒右上腹部皮膚、給予注射局部麻醉劑，以減輕穿刺部位之疼痛。
- (三)若無法配合檢查的病童，會由靜脈注射鎮靜劑，待入睡後再進行檢查。
- (四)醫師以穿刺針刺入肝臟，抽吸出肝臟組織檢體後，送病理部作組織切片檢查。
- (五)穿刺處以紗布覆蓋，膠布加壓止血。

### 四、檢查後注意事項：

- (一)以砂袋加壓傷口 6 小時並臥床休息，勿下床活動。
- (二)護理師會密切觀察病童血壓、脈搏、呼吸及出血之情形。
- (三)若觀察有無出血徵象（大量出血的機率低於百分之一），例如：傷口紗布滲血、心跳加快、四肢

冰冷、血壓下降等，若有上述現象，請立即告知醫護人員。

(四)病童完全清醒時，嘗試喝水後等待 15-30 分鐘

無嘔吐或嗆咳，即可進食。

(五)等待病理組織學報告約 3-7 天。

(六)24 小時後護理師會執行傷口換藥。

換藥方式如下：

	<p>使用無菌棉籤沾水溶性優碘，從傷口中心以環狀方式由內往外擦拭，不可重複來回，範圍應大於傷口外緣 5 公分。</p>
	<p>約 2 分鐘後，再以生理食鹽水同樣方式將優碘拭淨。</p>
	<p>最後以無菌紗布完全覆蓋傷口，紙膠固定。</p>

## 五、結論：

回家後仍需每日換藥至傷口結痂並保持口清潔及乾燥，若傷口有滲濕或紗布脫落也要隨時換藥，換藥時觀察傷口是否有出血情形、傷口圍皮膚顏色是否有紅、腫、熱、痛及異常分泌物情形，如有請返診。

## 六、參考資料：

楊晴涵、蘇建維(2020) . 臨床上良性肝臟腫瘤的治療指引. *臨床醫學月刊*，85(2)，103-108。

Jain, D., Torres, R., Celli, R., Koelmel, J., Charkoftaki, G., & Vasiliou, V. (2021). Evolution of the liver biopsy and its future. *Translational Gastroenterology and Hepatology*, 6,1-21.

<http://doi.org/10.21037/tgh.2020.04.01>

您喜歡這份衛教單張嗎?請拿起您的手機掃條碼完成滿意度，給我們回饋及建議，謝謝！



讓我們來進行測驗，以確認您已充分了解。

1. 肝臟組織切片檢查前 4-8 小時禁食、禁水。

是 否 不知道

2. 醫師以穿刺針刺入肝臟，抽吸出肝臟組織檢體後，送病理部作組織切片檢查。

是 否 不知道

3. 肝臟組織切片檢查後如：傷口紗布滲血、心跳加快、四肢冰冷、血壓下降等，若有上述現象，不需告知醫護人員。

是 否 不知道

4. 肝臟組織切片檢查後砂袋加壓傷口 6 小時並臥床休息，勿下床活動。

是 否 不知道

5. 回家後仍需每日換藥至傷口結痂並保持口清潔及乾燥。

是 否 不知道