




衛教編號:GI-009

2005.11.17 訂定
2022.03.24 (6 審)
2023.11.14(5 修)

肝膿瘍



全人智慧 醫療典範
愛心 品質 創新 當責

經一般外科醫師檢視
臺中榮民總醫院護理部編印

一、何謂肝膿瘍：

肝膿瘍是一種發生在肝臟的感染症，因細菌或寄生蟲進入肝臟造成發炎壞死，形成肝臟組織局部膿液聚集現象。好發於糖尿病、潛在的肝膽疾病或胰臟疾病、肝臟移植的病人。

二、症狀：

典型的肝膿瘍包含以下症狀：

(一)發燒：約 90%的病人有此症狀。

(二)腹痛：約 50-75%病人有此症狀，

通常發生在右上腹。


(三)其他症狀：噁心、嘔吐、體重下降、全身倦怠…等。



三、診斷方式：

(一)腹部超音波檢查。

(二)腹部電腦斷層檢查。



四、治療方法：

(一)抗生素藥物治療：當肝膿瘍小於或等於 5 公分時可以廣效性抗生素治療六至八週，初始靜脈施打抗生素治療，後續大多數可口服抗生素來完成療程。

(二) 放置引流管：當肝膿瘍大於 5 公分或多個膿腫，伴隨肝膽胰疾病時，則建議放置引流管將膿液引流出。

(三) 抗生素及膿液引流效果不佳時，則採腹部手術清除膿瘍。

五、引流管照顧的注意事項：

(一) 引流管剛放置時，引流液會略帶紅色血液是正常現象，但若引流液一直有紅色血液且量多，請告知護理師。

(二) 保持傷口清潔乾燥，每日換藥一次，當敷料滲濕或脫落，請重新換藥，避免傷口感染。


(三) 引流管使用布膠固定(如圖一)，避免拉扯而造成管子位置滑脫或改變。



以布膠固定
引流管


圖一 引流管固定方式

(四) 適時擠壓引流管，保持通暢，注意勿壓到或打結，以避免管路阻塞(如圖二)。



圖二 引流管保持通暢

(五)引流袋置放方式:躺著、坐著或下床活動時，引流袋都要放低，不可高過插管之傷口(如圖三)，以利引流液引流，避免引流液回流，造成感染惡化。



圖三 引流袋置放方式

(六)洗澡時避免浸濕傷口。

(七)出院時若需將引流管帶回家，要每天紀錄排出的引流膿液量，並定期返院回診。

六、日常生活注意事項:

(一)可採均衡飲食，增加抵抗力，要避免辛辣油膩、刺激性食物與生食。

(二)有以下情形，立刻返院檢查。

1.發冷、發熱、黃疸。

2.食慾不振、倦怠、嚴重腹痛。

3.引流管之傷口有紅、腫、熱、痛，或膽汁溢出，及膿性



分泌物。

4.引流管移位或滑脫。

七、結語:

當出現肝膿瘍症狀須即早就醫，並配合醫師指示進行檢查與治療，若有放置引流管，應遵循衛教內容進行管路照護，疾病的治療需要您與醫療團隊共同努力。

八、參考資料

戴靖庭、鄒曉婷、吳岱穎、郭冠良、蔡亮如 (2020)·細菌性肝膿瘍·家庭醫學與基層醫療, 35(6), 163-166。

Akhondi, H., & Sabih, D. E. (2023). Liver abscess. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.

Choi, D., Lee, H., Choi, M. J., Kim, K., Shin, Y., & Kim, J. S. (2023). Development of a drainage tube (Jackson-Pratt drain or hemovac) management protocol. *Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing*, 30(3), 371-381. <https://doi.org/10.7739/jkafn.2023.30.3.371>

Davis, J., & McDonald, M. (2023). Pyogenic liver abscess. *Uptodate*. https://www.uptodate.com/contents/pyogenic-liver-abscess?search=liver%20abscess&source=search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=default&display_rank=1

Harclerode, T. P., & Gnugnoli, D. M. (2022). Percutaneous abscess drainage. *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564356/>

Sharma, S., & Ahuja, V. (2021). Liver abscess: Complications and treatment. *Clin Liver Dis (Hoboken)*, 18(3), 122-126.

圖片來源

大腸癌照護網 (2020)·其他檢查-電腦斷層掃描·取自 http://www.crctw.org/Prevent_P3_e.aspx

pngtree (2020)·細菌·取自 https://zh.pngtree.com/freepng/various-cell-bacteria-group-map-png-free-material_4425348.html

pngtree(2020)·手繪肝臟·取自 https://zh.pngtree.com/freepng/hand-drawn-cartoon-liver-illustration_4625579.html

讓我們來進行測驗，以確認您已充分了解

1. 肝膿瘍是因細菌或寄生蟲進入肝臟造成發炎壞死，形成組織
膿液聚集現象。

是 否 不知道。

2. 肝膿瘍症狀通常有發燒、右腹痛、全身倦怠無力感。

是 否 不知道

3. 肝膿瘍治療後，為了增加抵抗力，可進食辛辣刺激生食飲食。

是 否 不知道

4. 肝膿瘍引流管應保持暢通，低於傷口以下，洗澡時避免浸濕傷
口，每天應紀錄引流顏色及量。

是 否 不知道

5. 肝膿瘍治療返家後，若傷口有紅腫熱痛或膿性分泌物應立即就醫
返診。

是 否 不知道