


















Umum perlindungan terhadap falls	Mudah menyebabkan jatuh	Derlu memperkual tindakan perlinde
<ol style="list-style-type: none"> 1. Roda tempat tidur tetap dan ketinggian tempat tidur diminimalkan. 2. Menyediakan bell kabel dan harus dipelihara dalam kisaran tekanan pasien. 3. Berbagai barang-barang yang umum digunakan di bidang visi pasien dan mudah diakses. 4. Tidak meninggalkan pasien sendiri oleh samping tempattidur. 5. Penggunaan bath kursi di Bath. 6. Ambil posisi duduk saat memakai celana, jangan berdiri clengan satu kaki. 	<p>1. Pasien telah jatuh untuk jatuh atau di rumah sakit</p> 	<p>1. Harus memahami penyebab kejatuhan dan melaksanakan upaya perlindungan yang sesuai dengan kondisi pasien</p> 
<ol style="list-style-type: none"> 7. Jika lantai licin, harap menginformasikan paramedis segera 8. Keluar dari tempat tidur dan memakai sepatu ukuran cocok 9. Celana panjang tidak lebih daripada pergelangan kaki untuk menghindari tersandung. 10. Kelemahan atau pusing setelah operasi, kemoterapi, atau berbagai pemeriksaan untuk menghindari tidur sendirian atau potty. <p>✳Apakah ada gangguan atau obat-obatan yang terkait dengan pembekuan darah? ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>✳Centang"ya"Harap diperhatikan:jatuh rentan terhadap pendarahan dancedera serius lainnya,tetapi juga perlu nutuk memperkuat Pencegahan jatuhnya.</p> 	<p>2. Gelisah</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengasuh perlu menghubungi staf keperawatan, silakan gunakan Bel, tidak meninggalkan pasien. 2. Pengasuh harus disertai sebanyak 24 jam dan, jika perlu, pastikan untuk menempatkan pasien yang tepat dan menginformasikan staf Keperawatan 3. Untuk alasan keamanan, tim medis akan membicarakan dengan Anda dan memberikan kendala perlindungan sesuai yang diperlukan. 4. Bar tidur harus ditarik dan tetap benar apabila tidur di. 

Mudah menyebabkan jatuh	Derlu memperkual tindakan perlindungan
<p data-bbox="73 172 589 252">3.Visi iskin, empengaruhi kehidupan sehari-hari</p>  <input data-bbox="421 544 456 576" type="checkbox"/>	<ol data-bbox="622 172 2011 603" style="list-style-type: none"> 1.Memakai gelas yang diperlukan dan menempatkan mereka dalam pasien mudah untuk mengambil berbagai 2.Gang di bangsal terus terang cerah 3.Gang dan tidur tidak mendorong item untuk menghindari tersandung 4.Semua meja dan kursi harus tetap dengan benar 5.Menginstruksikan pasien tidak untuk bangun dari tempat tidur sendirian, menggunakan Bel untuk mencari bantuan. 6.Pengasuh, silahkan pergi tidur di samping tempat tidur, untuk memfasilitasi pasien 7.Bar tidur harus ditarik dan tetap benar apabila tidur di 
<p data-bbox="73 643 521 778">4.Perlu untuk pergi ke toilet sering (sering urin atau diare)</p>  <input data-bbox="454 906 490 938" type="checkbox"/>	<ol data-bbox="622 643 1888 874" style="list-style-type: none"> 1.Memilih cara yang tepat untuk pergi ke toilet (urinoir, bedpan, Bedpan kursi). 2.Jika Anda merasa lelah, keluar dari tempat tidur dan mengurus seluruh perusahaan, atau menggunakan Bel untuk meminta bantuan. 3.Setelah makan malam, mengurangi asupan air. 4.Pergi ke toilet sebelum tidur dan mengurangi kesempatan untuk toilet. 
<p data-bbox="73 1026 577 1114">5.Membantu dalam pergeseran dan bertindak</p>  <input data-bbox="499 1393 535 1425" type="checkbox"/>	<ol data-bbox="622 1026 2123 1500" style="list-style-type: none"> 1.Pengasuh harus disertai sebanyak 24 jam dan, jika perlu, pastikan untuk menempatkan pasien yang tepat dan menginformasikan staf Keperawatan. 2.Dikombinasikan dengan latihan rehabilitasi untuk meningkatkan keterampilan otot kekuatan dan aktivitas. 3.Pengasuh harus terampil dalam pergeseran keterampilan (misalnya dari tempat tidur ke kursi roda, dll) dan harus meminta bantuan dari staf perawat jika diperlukan. 4.Penggunaan yang tepat dari alat bantu yang sesuai ambulasi (tebu, pejalan kaki, kursi roda). 5.Ketika mengubah posisi, menggunakan bagian sandaran tangan atau bar tidur untuk mendukung tubuh. 6.Berjalan keluar dari tempat tidur harus memakai ukuran cocok non-slip tas sepatu.

Mudah menyebabkan jatuh	Derlu memperkual tindakan perlindungan
<p>5.Membantu dalam pergeseran dan bertindak</p> 	<p>7.Menginstruksikan pasien tidak untuk bangun dari tempat tidur sendiri dan menggunakan Bel untuk mencari bantuan.</p> <p>8.Ketika Anda berada di tempat tidur, Anda harus menarik bar tidur dan memperbaikinya dengan benar.</p> <p>9.Pengasuh silakan pergi tidur di samping tempat tidur untuk memfasilitasi pasien untuk panggilan.</p> <p>10.Memilih cara yang tepat untuk pergi ke toilet (urinoir, bedpan, Bedpan kursi).</p> <p>11.Setelah makan malam, mengurangi asupan air.</p> <p>12.Pergi ke toilet sebelum tidur dan mengurangi kesempatan untuk toilet.</p> 
<p>6.Pusing</p> 	<p>1.Istirahat yang diperlukan untuk menghindari aktivitas tidur.</p> <p>2.Ketika Anda berada di tempat tidur, Anda harus menarik bar tidur dan memperbaikinya dengan benar.</p> <p>3.Menginstruksikan pasien tidak untuk bangun dari tempat tidur sendiri dan menggunakan Bel untuk mencari bantuan.</p> <p>4.Keluar dari tempat tidur atau mengubah sikap, mengambil progresif kegiatan: dari berbaring tidur, pertama di tempat tidur margin duduk untuk 1-3 menit, pusing ada ketidaknyamanan berdiri, berdiri pusing 1-3 poin, tidak ada untuk berjalan lagi.</p> <p>5.Ketika berjalan sadar memiliki pusing, harus bersandar di dinding perlahan-lahan duduk dan meminta bantuan.</p> <p>6.Memilih cara yang tepat untuk pergi ke toilet (urinoir, bedpan, Bedpan kursi).</p> <p>7.Setelah makan malam, mengurangi asupan air.</p> <p>8.Pergi ke toilet sebelum tidur, untuk mengurangi kemungkinan pergi ke toilet di malam hari.</p> <p>9.Cobalah 24 jam disertai dengan pengasuh, ketika Untuk meninggalkan, pastikan untuk memberitahu pasien dan perawat ditempatkan dengan benar.</p> <p>10.Silakan tutup pengasuh samping tempat tidur untuk tidur,memanggil kenyamanan pasien.</p>

Mudah menyebabkan jatuh	Derlu memperkual tindakan perlindungan
<p>7. Gunakan obat mudah atau</p> <p>【 Kata bawah Catatan rumah sakit farmasi: hipnotik sedatif, opioid, perawatan psikiatris, antidepresan seperti 】</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dicatat setelah mengambil situasi, keluar dari tempat tidur setelah mengambil untuk mengurangi dan memperhatikan keselamatan dari tempat tidur. 2. Jika sadar lelah, keluar dari tempat tidur kebutuhan pengasuh menemani, atau menggunakan bel sebagai orang mencari bantuan ketika menggunakan toilet. 3. Pergi ke toilet sebelum tidur, untuk mengurangi kemungkinan pergi ke toilet di malam hari. 4. Setelah makan malam, mengurangi asupan air. 5. Pilih cara yang tepat untuk pergi ke toilet (urinoir, toilet, kursi toilet). 6. Silakan tutup pengasuh samping tempat tidur untuk tidur, memanggil kenyamanan pasien. 

Kelompok risiko tinggi musim gugur: Adalah . (Selama salah satu dari mereka adalah, semakin besar risiko jatuh lebih mewakili)

* Silakan memasukkan ikon anti jatuh pada cincin tangan  ; Tanda "Mencegah jatuh" di samping tempat tidur.

Wali panduan : _____

Tanda tangan keluarga pasien : _____

Tanggal : ____ Tahun ____ Bulan ____ Hari

Yuk ikuti kuisnya untuk memastikan kamu paham.

1. Roda tempat tidur dipasang dengan benar, dan ketinggian tempat tidur harus selalu diturunkan ke tingkat terendah untuk mencegah jatuh.

Ya TIDAK Tidak tahu

2. Instruksikan pasien untuk tidak bangun dari tempat tidur sendirian, dan menggunakan bel panggilan untuk meminta bantuan bila bantuan diperlukan.

Ya TIDAK Tidak tahu

3. Jika merasa pusing saat berjalan, Anda dapat melanjutkan berjalan, jika bangun dari tempat tidur, Anda dapat segera bangun, tidak perlu melakukan pendekatan bertahap.

Ya TIDAK Tidak tahu

4. Pergi ke toilet sebelum tidur untuk mengurangi kemungkinan ke toilet di malam hari.

Ya TIDAK Tidak tahu

5. Jika merasa lemas, perlu didampingi pengasuh saat turun dari tempat tidur untuk ke toilet, atau menggunakan bel panggilan untuk meminta bantuan.

Ya TIDAK Tidak tahu