



陰囊手術

一、陰囊手術種類

- (一) 睪丸固定術：治療隱睪症，使睪丸下降至陰囊內。
- (二) 副睪丸手術：切除精液囊腫及其他腫塊，或為了阻塞性無精蟲的病人，由副睪丸取精。
- (三) 陰囊水腫切除：陰囊水腫囊袋，藉由手術剝除，減輕不適感。

二、手術前注意事項

- (一) 醫師予解釋手術事宜及麻醉方式後，請您填寫手術同意書、麻醉同意書。
- (二) 手術前需禁食禁水 8 小時。
- (三) 手術當天依約定時間至門診手術室報到。

三、手術後及居家照護注意事項

- (一) 手術後會轉入恢復室觀察，等麻醉完全恢復、生命徵象穩定後住院觀察，護理師會視您疼痛狀況，依醫師指示給予止痛藥物。
- (二) 術後禁食 6 小時，可先喝少量開水，若無噁

心、嘔吐或頭暈等不適，30 分鐘後即可採軟質飲食，飲食無特別禁忌。

(三) 術後醫師會親自評估傷口及說明，護理師會依醫師指示傷口護理。

(四) 手術傷口若不需拆線，依據醫師指示傷口照護。

(五) 術後一週內勿劇烈運動。

(六) 返家後若傷口大量出血、陰囊急速腫大發紫或高燒不退，請速到急診求治。

四、參考文獻

Dang, V. T., Pradere, B., de Varennes, A. M., Benali, N. A., Vallée, M., Berchiche, W., Gondran-Tellier, B., Margue, G., Michiels, C., Gaillard, C., Grevez, T., Bardet, F., Hulin, M., Manuguerra, A., Pinar, U., Plassais, C., Felber, M., Wandoren, W., Kaulanjan, K., Dominique, I., ... Khene, Z. E. (2022). Torsion of the spermatic cord in adults: a multicenter experience in adults with surgical exploration for acute scrotal pain with suspected testicular torsion. *Asian Journal of Andrology*, 24(6), 575–578. <https://doi.org/10.4103/aja2021126>

Eyre, R.C., OLeary, M.P., Law, K. (2023). Acute scrotal pain in adults · *UpToDate*. Retrieved May 30, 2023, from <https://www.uptodate.com/contents/acute-scortal-pain-in-adults>

讓我們來進行測驗，以確認您已充分了解

1. 陰囊手術後的傷口是不需要拆線。
是 否 不知道
2. 陰囊手術後，還是需要醫師診視確認狀況。
是 否 不知道
3. 陰囊手術傷口出現陰囊急速腫大或高燒不退，先喝水觀察即可。
是 否 不知道
4. 陰囊手術後 6 小時才可以喝水。
是 否 不知道
5. 睪丸手術後傷口一週內不可運動或是抬重物。
是 否 不知道