



## 血液管路拔除照護及注意事項

### 一、血液管路有哪些？

臨床上常見血液管路有週邊動脈導管、肺動脈導管、主動脈氣球幫浦（IABP）、兒科希克曼（Hickman）導管、血液透析雙腔導管、成人或小兒週邊置入中心靜脈導管（PICC）、中心靜脈導管、人工血管(port-A)等。




全人智慧 醫療典範  
愛心 品質 創新 當責

臺中榮民總醫院護理部編印

## 二、血液管路移除前有哪些注意事項？

1. 導管移除前，醫師與護理師會評估您是否為出血高風險對象，例如服用抗血栓藥物、使用抗凝血藥物等，醫師會依您的情況，決定延後拔管或拔除部位需延長額外加壓止血的時間。
2. 導管拔除後，為預防出血、滲血或血腫發生，請您務必注意及配合以下事項：

| 導管名稱   | 注意事項  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 主動脈氣球幫浦 (IABP)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 當日應盡量臥床休息，砂袋加壓期間肢體勿彎曲，避免劇烈運動。</li> <li>2. 24 小時內不可洗澡 (可採擦澡)。</li> <li>3. 三日內患肢勿搬運或提重物。</li> <li>4. 如有滲血、局部紅、腫、肢體末梢冰冷、麻木及刺痛感等，應告知護理師評估處理。</li> </ol> |
| <input type="checkbox"/> 肺動脈導管<br><input type="checkbox"/> 週邊動脈導管<br><input type="checkbox"/> 血液透析雙腔導管<br><input type="checkbox"/> 成人周邊置入中心靜脈導管 (PICC) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 務必遵循臥床平躺 2 小時，避免劇烈運動。</li> <li>2. 24 小時內不可下床洗澡(可採擦澡)，如有滲血、局部紅、腫、肢體末梢冰冷、麻木及刺痛感等，應告知護理師評估處理。</li> </ol>   |
| <input type="checkbox"/> 小兒周邊置入中心靜脈導管<br><input type="checkbox"/> 兒科希克曼導管 (Hickman Catheter)   | 觀察傷口異常出血、局部紅腫或異常哭鬧...等，應告知護理師評估處理。  |



### 三、結語：

血液管路是臨床治療不可或缺的途徑，為了讓血液管路移除安全，移除時必須預防「出血」、「滲血」及「血腫」等合併症；正確做好導管移除後傷口的加壓止血及照護注意事項，可以預防延遲性出血的狀況發生，以維護您的管路安全與品質。

### 四、參考資料：

陳憬儀、曾士芬、張奕文、吳振誠、曹祐慈、陳素里、鄭舒偉、徐永年（2020）。血管通路之病人安全異常事件：某區域醫院四年經驗分享。《醫學與健康期刊》，9(1)，73-82。

<https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=23046856-202003-202003180009-202003180009-73-82>

The Renal Association, British Renal Society & Intensive Care Society. *Recommendation for the Safe Removal of a Temporary Femoral Dialysis Line*. <https://britishrenal.org/news/recommendation-for-the-safe-removal-of-a-temporary-femoral-dialysis-line/> (2019).

Morgan, B. & London Health Sciences Centre. *Procedure: Removal of Central Venous Catheters (Jugular, Subclavian, Femoral)*. <https://www.lhsc.on.ca/critical-care-trauma-centre/procedure-removal-of-central-venous-catheters-jugular-subclavian#i> (2020)

讓我們來進行測驗，以確認您已充分了解

1.病人若有服用抗血栓及抗凝血等藥物，為出血高風險對象。

是 否 不知道

2.血液透析雙腔導管拔除後，需臥床平躺2小時，並避免劇烈運動。

是 否 不知道

3.導管拔除後可立即淋浴洗澡。

是 否 不知道

4.導管拔除部位有滲血、局部紅、腫、肢體末梢冰冷、麻木及刺痛感等，需立即告知護理人員。

是 否 不知道

5.正確做好導管移除後傷口的加壓止血，可以預防延遲性出血的狀況發生。

是 否 不知道